

Libellé de végétation	CB	Rattachement phytosociologique	Commentaire	Critères d'évaluation			Valeur patrimoniale
				Rareté régionale	Vulnérabilité régionale	Responsabilité régionale	
Végétations aquatiques, fontinales et amphibies							
Herbier des eaux stagnantes à Potamot crépu (<i>Potamogeton crispus</i>)	22.422	<i>Potamion pectinati</i> (W.Koch 1926) Libbert 1931	Herbiers aquatiques à potamots peu communs à rare selon les espèces concernées.	Assez rare	Données insuffisantes	Faible	Modéré
Herbier enraciné à Nénuphar jaune (<i>Nuphar lutea</i>) et Nénuphar blanc (<i>Nymphaea alba</i>)	22.4311	<i>Nymphaeion albae</i> Oberdorfer 1957	Herbiers aquatiques rares.	Rare	Vulnérable	Faible	Assez fort
Herbier des eaux stagnantes à <i>Callitrichebrutia</i> ou <i>Callitriche hamulata</i>	22.432	Ranunculion aquatilis Passarge 1964	Herbiers aquatiques assez communs sur le plan d'eau stagnante, constituées d'espèces sous-inventoriées et ainsi mal connues (patrimonialité potentielle)	Données insuffisantes	Données insuffisantes	Faible	Faible
Végétation fontinale collinéenne à Lotier des fanges et Dorine à feuilles opposées	54.11	Caricion remotae Kästner 1941	Formation végétale peu rependue dans la région Rhône Alpes.	Peu Commun	Données insuffisantes	Faible	Faible
Landes							
Sarothamnaie supra-méditerranéenne à Chêne vert	31.841	Sarothamnion scoparii Tüxen ex Oberdorfer 1957	Formation végétale assez mal connue, semble rare dans le Massif central	Assez rare	Données insuffisantes	Faible	Modéré
Pelouses sèches							
Pelouse annuelle à Arnosérís naine et Spergule de Morison	35.21	Thero-Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957	Groupement à Arnosérís naine et Spergule de Morison est peu fréquente, sur une aire de répartition restreinte au sud-est de la France, se développant sur substrat rocheux acides, à l'étagé supraméditerranéen,	Peu commun	Non menacé	Forte	Modéré
Pelouse annuelle acidiphile à Silène de France (<i>Silene gallica</i>) et Pied-d'oiseau comprimé (<i>Ornithopus compressus</i>)	35.3	Helianthemion guttati Br.-Bl. Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940	Formation rare dont la répartition en France se limite à la frange nord du domaine méditerranéen.	Rare	Quasi-menacé	Moyenne	Assez fort
Pelouse annuelle thermophile à Crucianelle à feuilles étroites (<i>Crucianella angustifolia</i>) et Catapode des graviers (<i>Micropyrum tenellum</i>)	35.3	Helianthemion guttati Br.-Bl. Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940	Formation rare dont la répartition en France se limite à la frange nord du domaine méditerranéen.	Rare	Quasi-menacé	Moyenne	Assez fort
Prairies humides, bas-marais et mégaphorbiaies							
Prairie collinéenne à Renoncule rampante et Jonc à tépales aigus	37.2	Ranunculo repentis-Juncetum acutifl ori Billy 2000	Groupement assez fréquent mais dont l'aire de répartition se limite au Massif central (formation typique de cette aire géographique)	Peu Commun	Données insuffisantes	Moyenne	Modéré
Prairie du collinéen inférieur à Menthe suave et Jonc à tépales aigus	37.22	Potentillo anserinae-Polygonetalia avicularis Tüxen 1947	Formation présente uniquement dans la partie sud-est du Massif Central, ou elle est peu fréquente.	Assez rare	Données insuffisantes	Forte	Fort
Nardaie mésohygrophile à Sanguisorbe officinale	37.32	Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964	Habitat rare en France et peu fréquent dans le Massif Central, vulnérable à la fertilisation des milieux.	Assez rare	Quasi-menacé	Moyenne	Assez fort
Pelouse mésohygrophile à Sélin des Pyrénées (<i>Epikeros pyrenaeus</i>) et Jonc raide (<i>Juncus squarrosus</i>)	37.32	Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964	Habitat rare en France et peu fréquent dans le Massif Central, vulnérable à la fertilisation des milieux.	Assez rare	Quasi-menacé	Moyenne	Assez fort

Libellé de végétation	CB	Rattachement phytosociologique	Commentaire	Critères d'évaluation			Valeur patrimoniale
				Rareté régionale	Vulnérabilité régionale	Responsabilité régionale	
Forêts							
Chênaie pédonculée - Frênaie à Géranium noueux (<i>Geranium nodosum</i>)	41.3	Fraxino excelsioris-Quercion roboris Rameau 1996 nom. inval.	Formation forestière méconnue dont la répartition se limite à la frange méridionale du Massif central.	Rare	Données insuffisantes	Moyenne	Assez fort
Chênaie sessiliflore collinéenne acidiphile	41.5	Hieracio praecoci-Quercetum petraea Billy 1997	Forêt climacique, groupement assez typique du Massif Central	Assez rare	Quasi-menacé	Moyenne	Assez fort
Chênaie pubescente neutroclinophile supraméditerranéenne à Sauge glutineuse (<i>Salvia glutinosa</i>)	41.71	Quercion pubescenti-sessilifl orae Br.-Bl. 1932	Formation peu fréquente dans le Massif Central, retrouvée sur les contreforts méridionaux	Assez Rare	Non menacé	Faible	Modéré

Tableau 13 : Synthèse des habitats remarquables non-inscrits à la Directive Habitats